



Atractocolax

Monotypisch

Niet uit Nederland of Vlaanderen bekend

Vruchtlichaam bestaat uit gelatineuze druppels, sporen repeterend en paarsgewijs (bron: Mycokey). Aan de binnenzijde van graafgangen van schorskevers: *Crypturgus pusillus* (Kleine sparrenschorskever), *Dryocoetes autographus* (Ruige dennenschorskever), *Hylurgops palliatus* (Geelbruine sparrenbastkever), *Ips typographus* (Letterzetter), *Orthotomicus laricis* (Lariksschorskever), *Pityogenes chalcographus* (Koperetser). In naaldbomen waaronder *Picea abies* en *Pinus sylvestris*. Bekend uit Duitsland (Bremerhaven en Beieren) en Zwitserland (Kirschner et al. 1999).
..... *Atractocolax pulvinatus*
Kirschner et al., *Mycologia* 91(3): 538-543

Opmerkingen

Het is niet duidelijk of de vruchtlichamen ook in het veld zijn aangetroffen of alleen bekend zijn van kweek.

Literatuur

Kirschner, R., R. Bauer & F. Oberwinkler 1999. *Atractocolax*, a new heterobasidiomycetous genus based on a species vectored by conifericolous bark beetles. *Mycologia* 91(3): 538 – 543

<http://www.mycology.com/MycoKeySolidState/genera/Atractocolax.html>