



Chionosphaera

Gebaseerd op Roberts 1997 en Kirschner *et al.* 2001

Niet uit Nederland en Vlaanderen bekend

- 1 In holtes van schorskevers groeiend; gespen ontbreken.
..... *Chionosphaera cuniculicola* R. Kirschner, D. Begerow & Oberw.
[Kirschner *et al.* 2001, Mycol. Res. 105\(11\): 1403-1408](#)
Op korstmossen groeiend; gespen bij de septen van de hyfen en aan de basis van de basidiën
aanwezig (soms lastig waar te nemen omdat de gespen kunnen uitgroeien). 2
- 2 Basidiën 20-45 µm lang *Chionosphaera lichenicola* Alstrup, B. Sutton & Tünsberg
[Kirschner *et al.* 2001, Mycol. Res. 105\(11\): 1403-1408](#)
Basidiën 60-70 µm lang *Chionosphaera coppinsii* P. Roberts
[Roberts 1997, Mycotaxon 63: 195-216](#)

Opmerkingen

C. coppinsii bekend van *Parmelia glabratula* en *Lecidella elaeochroma* (Groot-Brittannië).

Literatuur

Kirschner, R., Begerow, D. & Oberwinkler, F. 2001. A new *Chionosphaera* species associated with conifer inhabiting bark beetles. *Mycol. Res.* 105(11): 1403-1408

Roberts, P. 1997. New heterobasidiomycetes from Great Britain. *Mycotaxon* 63: 195-216