



## *Fibulosebacea*

Monotypisch

Vruchtlichaam korstvormig, taai met een dikke, behaarde rand.  
Niet uit Nederland en Vlaanderen bekend.

- 1 Basidiën 16-22(-24) x 13-21(-23)  $\mu\text{m}$ ; sporen 13-17(-20) x 8-10  $\mu\text{m}$  . . . . . *Fibulosebacea strigosa*  
Wells & Raitviir, *Trans. Br. Mycol. Soc.* 89(3): 341-346
- Basidiën 12-18 x 8-11  $\mu\text{m}$ ; sporen 15-18 x 6-7  $\mu\text{m}$  . . . . . *Heterochaete macrochaete*  
Jülich: 416

### Opmerkingen

- Deze soort staat in geen van de standaardwerken, maar is o.a. uit Portugal, Frankrijk, Denemarken en Noorwegen bekend (GBIF april 2017, Wells & Raitviir 1987)
- In *Fibulosebacea* zijn de tandjes, als ze aanwezig zijn, meestal fertiel, maar soms ook steriel en dan is verwarring mogelijk met *Heterochaete macrochaete*, die altijd tandjes in het hymenium heeft (Wells & Raitviir 1987).
- Er is ook verwarring mogelijk met *Eichleriella*, omdat de vruchtlichamen dik en taai zijn en de basale laag uit dikwandige hyfen met gespen bestaat.

### Literatuur

Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Wells, K. & A. Raitviir 1987. New and noteworthy taxa of the Exidiaceae of the U.S.S.R. *Trans. Br. Mycol. Soc.* 89(3): 341-346