



Guepiniopsis

syn. *Heterotextus*

Sleutel tot de Noordwest-Europese soorten
Gebaseerd op Jülich 1984 en Hansen & Knudsen 1997 (H&K)

Er is verwarring mogelijk met *Dacrymyces*. *Guepiniopsis* onderscheidt zich van *Dacrymyces* door het bezit van een gedifferentieerde cortex, maar dat kenmerk is niet altijd even duidelijk te herkennen. Bij twijfel dan ook *Dacrymyces* raadplegen.

Vet - Uit Nederland en/of Vlaanderen bekend

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1 | Hyfen met gespen. | 2 |
| | Hyfen zonder gespen | 3 |
| 2 | Sporen met 1-3 septen | <i>G. alpina</i> |
| | | Jülich: 441 |
| | | H&K: 96 (als <i>Heterotextus</i> a.) |
| | Sporen met 5-7 septen. | <i>G. suecicus</i> |
| | | Jülich: 442 |
| 3 | Sporen met 1-3 septen; probasidia knotsvormig | <i>G. buccina</i> |
| | | Jülich: 441 |
| | Sporen met 5-7 septen; probasidia omgekeerd knotsvormig tot urnvormig. | <i>G. estonicus</i> |
| | | Jülich: 437 |
| | | H&K: 94 (als <i>Dacrymyces</i> e.) |

Synoniemen

- *G. chrysocoma* nu *Dacrymyces chrysocomus*

Opmerkingen

- Let op vanwege het heen-en-weer switchen van soorten: *G. ovispora* B. Liu & L. Fan \neq *Dacrymyces ovisporus*. *G. ovispora* is niet-Europees (Zie Mycobank, Index Fungorum)
- Het is niet bekend of het basidiumtype (zie Van de Put 2014) van enige waarde is bij *Guepiniopsis*.

Literatuur

- Hansen, L. & H. Knudsen (ed.) 1997. Nordic macromycetes Vol. 3. Heterobasidioid, aphylophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Nordsvamp, Kopenhagen
- Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart
- Krieglsteiner, G.J. 1991. Neue, seltene, kritische Makromyzeten XIII. Zeitschrift f. Mykologie 57(1): 29-31
- McNabb, R. 1965. Taxonomic studies in the Dacrymycetaceae IV *Guepiniopsis* Patouillard. New Zealand Journal of Botany 3(2): 159-167
- Van de Put, K. 2014. Basidiomorfolgie bij *Dacrymyces*. Sterbeekia 33: 41-44