



Herpobasidium

Voor Europa. Gebaseerd op Oberwinkler et al., Trans. Br. Mycol. Soc. 83(4): 639-658

Niet uit Nederland en Vlaanderen bekend

- 1 Basidiën (bijna) recht, 2-cellig; bladslippen misvormd, gerafeld; in de voorzomer aan de onderzijde wittige plukjes schimmel, die tenslotte zwart worden; op o.a. Wijfjesvaren (*Athyrium filix-femina*), *Cystopteris montana*, Mannetjesvaren (*Dryopteris filix-mas*), driehoeksvaren (*Gymnocarpium*), beukvaren (*Phegopteris*), Adelaarsvaren (*Pteridium aquilinum*) . . . *Herpobasidium filicinum*

Jülich: 397

H&K: 78

[Oberwinkler et al., Trans. Br. Mycol. Soc. 83\(4\): 639-658](#)

Basidiën gedraaid, later bochtig, 2- tot 4-cellig; topdeel van het blad is misvormd, aan boven- en onderzijde een dun wit of crème schimmel-film; op Struisvaren (*Matteuccia struthiopteris*)

.....*Herpobasidium struthiopteridis*

Jülich: 397

H&K: 78

[Oberwinkler et al., Trans. Br. Mycol. Soc. 83\(4\): 639-658](#)

Synoniemen

Herpobasidium deformans nu *Insolibasidium d.*

Literatuur

Hansen, L. & H. Knudsen (ed.) 1997. Nordic macromycetes Vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gastromycetoid Basidiomycetes. Nordsvamp, Kopenhagen

Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart

Oberwinkler, F. & Bandoni, R. 1984. *Herpobasidium* and allied genera. Trans. Br. Mycol. Soc. 83(4): 639-658

<http://bladmineerders.nl/parasites/fungi/basidiomycota/pucciniomycotina/pucciniales/eocronartiaceae/herpobasidium/herpobasidium-filicinum/?lang=nl>

<http://bladmineerders.nl/parasites/fungi/basidiomycota/pucciniomycotina/pucciniales/eocronartiaceae/herpobasidium/herpobasidium-struthiopteridis/?lang=nl>