



## *Heteroacanthella*

Voor Nederlandse en Vlaamse soorten

**Vet** - Uit Nederland en/of Vlaanderen bekend

- 1 In korstmoss groeiend (thallus van *Lecanora carpinea*) ..... *H. ellipsospora*  
[Zamora et al., Lichenologist 46\(1\): 17-23](#)
- Niet in korstmoss groeiend ..... 2
- 2 Met gespen, basidiën éénsporig (soms met 'pseudosterigme' of vertakt sterigme) .....  
..... ***H. acanthophysa***  
[Roberts: 131](#)  
[Oberwinkler et al., Trans. Mycol. Soc. Japan 31: 207-213](#)
- Zonder gespen, basidiën één- of tweesporig ..... *H. variabilis*  
[Roberts: 134 \(als \*H. variabile\*\)](#)  
[Oberwinkler et al., Trans. Mycol. Soc. Japan 31: 207-213](#)

### Literatuur

- Oberwinkler, F., E. Langer, H.H. Burdsall, J. Tschen 1990. *Heteroacanthella*: a new genus in the Tulasnellales. Trans. Mycol. Soc. Japan 31: 207-213
- Roberts, P. 1999. *Rhizoctonia*-forming fungi. A taxonomical guide. Royal botanic gardens, Kew
- Zamora, J.C., S. Pérez-Ortega, V.J. Rico 2014. *Heteroacanthella ellipsospora* sp. nov., first lichenicolous basidiomycete with acanthoid basidia. The Lichenologist 46(1): 17-23

